



SECRETARÍA DE GESTIÓN SANITARIA

Y

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Resolución Conjunta 36/2025

RESFC-2025-36-APN-SGS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 01/07/2025

VISTO el Expediente N° EX-2022-115005819- -APN-DLEIAER#ANMAT; los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a raíz de diversas solicitudes a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) de incorporación de diferentes especies vegetales a los artículos 888 y 822, del Capítulo XI "Alimentos Vegetales", del Código Alimentario Argentino (CAA).

Que la inclusión de estas especies en el CAA otorga un marco regulatorio para su comercialización en todo el territorio argentino y permite mantener la biodiversidad de especies nativas, revalorizar las tradiciones y respetar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.

Que el Instituto Misionero de Biodiversidad solicitó la inclusión de los frutos de *Plinia cauliflora* (Mart.) Kausel de la familia Myrtaceae, n.v. "jabuticaba"; de los frutos de *Plinia rivularis* Cambess Rotman de la familia Myrtaceae v.n "yvapority" y de los frutos de *Eugenia pyriformis* Cambess de la familia Myrtaceae n.v. "uvaia".

Que, por su parte, la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación solicitó la inclusión de los frutos de *Bromelia balansae* Mez de la familia Bromeliaceae, n.v. "caraguatá"; los frutos de *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) de la familia Fabaceae, n.v. "chañar"; los frutos de *Allophylus edulis* (St.-Hil.) Radlk de la familia Sapindáceas, n.v. "chal chal o cocú"; los frutos de *Cyclanthera pedata* (L.) Shader de la familia Cucurbitaceae, n.v. "achojcha o caigua"; los frutos de *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, de la familia Arecaceae, n.v. "pindó, coquito o jerivá"; los frutos de *Vasconcellea quercifolia* A. Sc. Hilaire de la familia Caricaceae, n.v. "higuera del monte, papaya del monte, mamón del monte, papaya silvestre, sacha higo o sacha higuera"; los frutos de *Eugenia myrcianthes* Nied. de la familia Myrtaceae, n.v. "ubajay"; los frutos de



Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand de la familia Myrtaceae, n.v. "guabiyú o guabijú"; los frutos de *Eugenia involucrata* DC de la familia Myrtaceae, n.v. "cerella o cereza del monte"; los frutos de *Araujia odorata* (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder, de la familia Asclepiadaceae, n.v. "tasi o doca"; los frutos de *Capsicum baccatum* var. *baccatum* L. Irish de la familia Solanaceae, n.v. "ají kitucho, ají cohincho, laji o quitucho"; de los frutos de *Plinia peruviana* (Poir.) Govaerts de la familia Myrtaceae, n.v. "Jaboticaba, Yaboticaba o Jabuticaba"; los frutos de *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. de la familia Caricaceae, n.v. "Jacaratía o Yacaratiá"; los frutos de *Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart. de la familia Arecaceae, n.v. "mbocayá, cocotero, nuez o coco del Paraguay"; los frutos de *Annona emarginata* (Schltdl.) H. Rainer de la familia Annonaceae, n.v. "arachichú, araticú, yerba mora, aratikú o chirimoya del monte"; los frutos de *Gunnera apiculata* Schindl de la familia Gunneraceae, n.v. "quirusilla" y los frutos de *Berberis commutata* (Eichler) de la familia Berberidaceae, n.v. "uvilla de gente, uvilla grande, palo amarillo o micuna".

Que los frutos de *Plinia cauliflora* (Mart.) Kausel de la familia Myrtaceae, n.v. "JABUTICABA", provienen de una planta nativa del Bosque Atlántico del noreste argentino que se consume como alimento tradicionalmente, tanto en Brasil como en Argentina, siendo utilizados históricamente por pueblos originarios de la región.

Que en Brasil, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Abastecimiento, ha establecido los Estándares de Identidad y Calidad tanto para la pulpa de jabuticaba como para el jugo (Instrucciones Normativas N°34 y 37) así como su composición nutricional se encuentra declarada en la Tabla Brasileira de Composición de Alimentos (TBCA por sus siglas en portugués).

Que los frutos de *Plinia rivularis* Cambess Rotman de la familia Myrtaceae, conocida como "YVAPORITY" provienen de una planta nativa del Bosque Atlántico, presente en el noreste argentino, de uso ancestral y su consumo como alimento forma parte de la tradición tanto en Brasil como en Argentina.

Que los frutos de *Eugenia pyriformis* Cambess de la familia Myrtaceae, conocida en la Argentina como "UVAIA", proceden de una planta nativa del Bosque Atlántico típico del noreste argentino; su fruta es de uso ancestral y se ha consumido históricamente por pueblos originarios de la región en preparados como mermeladas, jugos, pulpas, helados, licores y/o compotas.

Que los frutos conocidos en Argentina como "CARAGUATÁ" se distribuyen en Corrientes, Entre Ríos y Misiones y en las zonas ribereñas de Formosa y Chaco; se consumen crudos, hervidos o asados, para la preparación de dulces, jaleas, helados o jugos e incluso bebidas alcohólicas como cerveza, licores, entre otras preparaciones.

Que en relevamientos de fuentes históricas y etnográficas, se ha identificado el uso comestible de estos frutos por diversas comunidades originarias del norte argentino.

Que el fruto de *Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) de la familia Fabaceae, conocido como "CHAÑAR" es consumido tradicionalmente por pobladores rurales como fruta fresca, tostada, hervida y/o fermentada o en conserva; se reconocen los antecedentes de uso alimenticio por parte de las comunidades del monte del Gran Chaco Argentino tales como las etnias Wichi, Qom, Qomle'ec, Pilagá, Chorote, Chulupí, Maká.





Que la especie conocida comúnmente en Argentina como “CHAL CHAL” o “COCÚ”, corresponde a los frutos de *Allophylus edulis* (St.-Hil.) Radlk de la familia Sapindáceas, distribuida en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires.

Que el Cocú o Chal Chal es conocido y utilizado por los Guaraníes, los Tobas y las comunidades originarias de las Yungas Septentrionales y las del monte del Gran Chaco tales como los Wichi, Qom, Qomle'ec y Pilagá.

Que los frutos de *Cyclanthera pedata* (L.) Shader, conocidos comúnmente en Argentina como “ACHOJCHA” o “CAIGUA”, provienen de una enredadera que produce abundantes frutos comestibles y fueron un alimento muy importante para las antiguas culturas andinas y, actualmente, lo sigue siendo para pequeñas comunidades del noroeste argentino ya que se distribuye en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy y puede ser consumida fresca o bien en preparaciones, guisos, mermeladas o licores.

Que los frutos de *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, de la familia Arecaceae, se conocen comúnmente como “PINDO”, “COQUITO” o “JERIVA”, provienen de una de las especies de palmeras más comunes distribuidas en el Bosque Atlántico que ocupa las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, porciones orientales de Santa Fe, San Juan, y San Luis.

Que la fruta se consume tanto cruda como en licores o snacks y existen antecedentes de consumo de los frutos como goma de mascar (“jerivá” significa ‘fruta gomosa’) y en bebidas fermentadas (mbochochó).

Que los frutos de *Vasconcellea quercifolia* A. Sc. Hilaire de la familia Caricaceae, n.v. “HIGUERA DEL MONTE”, “PAPAYA DEL MONTE”, “MAMÓN DEL MONTE”, “PAPAYA SILVESTRE”, “SACHA HIGO”, “SACHA HIGUERA” se distribuyen en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán; se consumen frescos, asados o procesados en jugos, en mermeladas, en conservas o productos lácteos, o bien preparados en salsas, rellenos de pasteles y encurtidos.

Que los frutos de *Eugenia myrcianthes* Nied. de la familia Myrtaceae, conocida comúnmente en Argentina como “UBAJAY” se reconocen como especie nativa de Argentina y se encuentran en las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; son de sabor agri dulce y se consumen en fresco, en jugos, en preparaciones dulces (compotas, mermeladas) y en vinagres.

Que los frutos de *Myrcianthes pungens* (O. Berg) D. Legrand de la familia Myrtaceae, conocida comúnmente en Argentina como “GUABIYÚ” o “GUABIJÚ”, se desarrollan en las ecorregiones de Selva de Yungas y Selva Paranaense, en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos y se consumen frescos, con piel o sin ella, en mermeladas y otros productos como dulces, pulpas, yogures, jugos, helados, licores y fermentados; y en relevamientos de fuentes históricas y etnográficas, se ha identificado el uso comestible de estos frutos por diversas comunidades originarias del norte argentino.

Que de los frutos conocidos comúnmente en Argentina como “CERELLA” o “CEREZA DE MONTE” provienen de la *Eugenia involucrata* DC, de la familia Myrtaceae, con distribución nativa en el Nordeste argentino (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa) y se consumen al natural o como aperitivos, para elaborar jugos, yogurt, helados, mermeladas, jaleas, licores, vinos y vinagres y, en relevamientos de fuentes históricas y etnográficas se ha



identificado el consumo de los frutos de esta especie por parte de las comunidades guaraníes.

Que los frutos de *Araujia odorata* (Hook. & Arn.) Fontella & Goyder, de la familia *Asclepiadaceae*, conocidos como "TASI" o "DOCA" se encuentra en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe y San Juan y es típica de la flora chaqueña; se consumen tiernos e inmaduros, enteros y crudos, sin ninguna preparación o en preparaciones como ensaladas, dulces, mermeladas o en almíbar y, de relevamientos de fuentes históricas y etnográficas, se ha identificado el uso comestible de estos frutos por diferentes comunidades indígenas del Gran Chaco Sudamericano, como los Ayoreo, Maká, Pilagá Chorote, Vilela, Tobas del oeste (Pilagá), Toba del este, Guaraní Izoceño (o Chiriguano), Maskoy y Wichí.

Que el fruto de *Capsicum baccatum* var. *baccatum* L. Irish. de la familia *Solanaceae* conocido comúnmente en Argentina como "AJÍ KITUCHO", "AJÍ COHINCHO", "LAJI" o "QUITUCHO" tiene una amplia distribución en América del Sur, desde Colombia hasta Brasil, Paraguay y Uruguay y, en Argentina, se encuentra en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán, cuyo uso en la gran variedad de *Capsicum* a lo largo del tiempo evidencia que fue un elemento de consumo supremo de los pueblos amerindios, volviéndose parte de su cultura e identidad, lo cual se refleja en las distintas preparaciones y usos siendo el saborizante por excelencia y el condimento clave de comidas tradicionales, tanto fresco como en salsas, pastas, encurtidos, cerveza o como especias secas.

Que el fruto de *Plinia peruviana* (Poir.) Govaerts, de la familia *Myrtaceae*, conocido comúnmente en Argentina como "JABOTICABA", "YABOTICABA" o "JABUTICABA" se distribuye en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y se consumen tradicionalmente frescos, al natural, en la producción de jugos, bebidas, helados, jaleas, mermeladas, vinagres, jarabes, licores y jeropigas; además, el bagazo de jaboticaba se utiliza en la elaboración de harinas para la elaboración de budines, purés, tortas, panes, galletas, barquillos, pastas, identificándose el uso comestible de estos frutos por diferentes comunidades indígenas, tanto del Gran Chaco como del Bosque Atlántico del Alto Paraná según relevamientos de fuentes históricas y etnográficas.

Que el fruto de *Jacaratia spinosa* (Aubl.) A. DC. de la familia *Caricaceae*, conocido comúnmente en Argentina como "JACARATIÁ" o "YACARATIÁ" es nativo de Argentina, Brasil y Paraguay, distribuyéndose en Argentina en las provincias de Misiones y Corrientes donde se consume fresco, cristalizado o asado, en la preparación de mermeladas, jaleas o licores (especialmente la pulpa) y posee un gran potencial para la fabricación de helados, la producción de sultanas, frutas confitadas o deshidratadas.

Que los frutos conocidos comúnmente en Argentina como "MBOCAYÁ", "COCOTERO", "NUEZ" o "COCO DEL PARAGUAY" son frutos de *Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. Ex Mart, de la fam. *Arecaceae*, de amplia distribución en regiones tropicales y subtropicales, desde México hasta el Noreste de Argentina, abarcando las regiones biogeográficas de Yunga Paranaense y Chaqueña, Corrientes, Formosa, Misiones y Salta.

Que el mismo es consumido, según relevamientos de fuentes históricas y etnográficas, por diversas comunidades originarias de manera fresca y/o hervida en leche como gachas para niños, en helados y diversas recetas dulces con harina de pulpa e incluso prensada (se obtiene un aceite ligero) o bien fermentada para obtener un licor de sabor agradable; las semillas consumen asadas o cocidas o directamente ralladas o molidas.



Que los frutos de *Annona emarginata* (Schltdl.) H. Rainer, de la familia Annonaceae, conocida comúnmente en Argentina como "ARACHICHÚ", "ARATICÚ", "YERBA MORA", "ARATIKÚ" o "CHIRIMOYA DEL MONTE", se distribuye en las provincias del nordeste de Argentina y en las Yungas y, de acuerdo a relevamientos de fuentes históricas y etnográficas, se ha identificado el uso comestible de estos frutos por diversas comunidades originarias del nordeste argentino como Tobas y Guaraníes, tanto crudos como en jugos y pulpas, para la preparación de helados, yogures, licores, jaleas y mermeladas, entre otros.

Que la especie *Gunnera apiculata* Schindl., de la familia Gunneraceae, conocida comúnmente en Argentina como "QUIRUSILLA" se distribuye en Jujuy y Salta; consumen los peciolos crudos, en ensaladas o en forma similar a una fruta, y en elaboración de mermeladas, jugos, gelatina, helado y licor o cóctel.

Que la especie *Berberis commutata* (Eichler), de la familia Berberidaceae, conocida comúnmente en Argentina como "UVILLA DE GENTE", "UVILLA GRANDE", "PALO AMARILLO" o "MICUNA" se distribuye en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán y sus bayas se utilizan para consumo de manera cruda y/o en la fabricación de dulces, mermeladas, jarabes, helados, licores o deshidratados.

Que históricamente, las especies de *Berberis* spp. han hecho una importante contribución a la alimentación y la salud de varias culturas locales de acuerdo a relevamientos de fuentes históricas y etnográficas en los que se ha identificado que los frutos de esta especie eran muy apreciados por Diaguitas y Calchaquies.

Que oportunamente, la empresa Nu Skin Argentina Inc. Sucursal Argentina solicitó la inclusión de la fruta GAC (*Momordica cochinchinensis*) al CAA para la elaboración de suplementos dietarios siendo esta fruta originaria de Vietnam y otros países del Sudeste Asiático, de color rojo brillante, rica en β -caroteno y licopeno, de cosecha estacional y utilizada principalmente en la elaboración de preparaciones culinarias.

Que la señora Roberta ROCHA CASSIANO BARBOSA solicitó la incorporación al CAA del fruto de *Theobroma grandiflorum*, n.v. cupuaçu o copoazú, originario de la región de Amazonía, del que se consume tanto la pulpa como la semilla; producto autorizado por el Ministerio de Agricultura de Brasil como apto para el consumo humano y considerado en ese país como "Fruta Nacional" por la Ley N° 11.675 de 19 de mayo de 2008.

Que, en el proyecto de resolución conjunta tomó intervención el Consejo Asesor de la CONAL (CONASE) y se sometió a la Consulta Pública.

Que la CONAL ha intervenido expidiéndose favorablemente.

Que los Servicios Jurídicos permanentes de los organismos involucrados han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 815 del 26 de julio de 1999 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN SANITARIA





Y

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°. - Sustitúyese el Artículo 822 del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 822: Las hortalizas frescas destinadas a la alimentación deberán estar sanas y limpias. Se entiende por sana la que está libre de enfermedades o de lesiones de origen físico, químico o biológico y, limpia, la que está libre de insectos, ácaros o cualquier sustancia extraña. Las hortalizas se agrupan en las siguientes categorías, a saber:

RAICES Y TUBÉRCULOS	Nombre taxonómico
Categoría y nombres comunes	
Achira o Caña de la India, raíz de	<i>Carina edulis</i> Kar. Gawl.
Ajapa	<i>Ajapa Pachyrrhizus alpinus</i> (Woods) Parodi
Ajuga, raíz de	<i>Ajuga reptans</i> L.
Ajo-dibano o Ajo-nabo, raíz engrosada de	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>napaceum</i> (Mill.) DC.
Amarillita o Zanahoria Blanca	<i>Amarillita var. var. var.</i>
Batata, Papa dulce, Boniato, Moniato o Camote, raíz de	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
Chufa, Cautín o Almendra de tierra, pequeño tubérculo de	<i>Cyperus esculentus</i> L.
Maíz	<i>Zea mays</i> (L.) Gaertn.
Mandioca o Yuca, raíz de	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
Morinda, raíz, raíz o raíz, tubérculo de	<i>Trigonotis tuberosum</i> Ruiz et Pavon
Ramé, Yame o Batata de China, raíz de	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.
Oca o papa Oca, tubérculo de	<i>Oxalis tuberosa</i> Molina
Papa indigena, tubérculo de	<i>Solanum tuberosum</i> L. subsp. <i>andigena</i> (Luz. & Bukasov)
Papa o Patata, tubérculo de	<i>Solanum tuberosum</i> L. subsp. <i>andigena</i> (Luz. & Bukasov)
Patiraca o Chirina, raíz de	<i>Patiraca sativa</i> L.
Rábano o Rabanito, raíz de	<i>Raphanus sativus</i> L.
Radicha, raíz de	<i>Cichorium intybus</i> L.
Ramónchita o Batatada, raíz de	<i>Beta vulgaris</i> L.
Salsifí blanco, raíz de	<i>Trigonotis tuberosum</i> Ruiz et Pavon
Salsifí negro, raíz de	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
Tapi, Maniaca o Batatada, raíz tuberosa de	<i>Coleoselinum esculentum</i> (L.) Schott
Tapiambar, Tapiambar, Cofia, Papa árabe o Pataca, tubérculo de	<i>Hesperanthus tuberosus</i> L.
Ulluco, amoleco, ullico, Ullu o papa fisa, tubérculo de	<i>Ullucus tuberosus</i> Caldas
Yacón, raíz tuberosa de	<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp.) H. Rob.
Zanahoria, raíz de	<i>Daucus carota</i> L.
BULBOS Y HOJAS ENVAINADORAS	
Ajo, bulbo de	<i>Allium sativum</i> L.
Cebolla de verdor o Cebollita, hojas envainadoras de	<i>Allium fistulosum</i> L.
Cebolla, bulbo de	<i>Allium cepa</i> L.
Cebollito o Cebollito, hojas envainadoras de	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
Cebollito de la China, hojas envainadoras de	<i>Allium tuberosum</i> Sprengel // <i>Allium odoratum</i> L.
Echalote o Chalote, bulbillos de	<i>Allium ascalonicum</i> L. // <i>Allium cepa</i> Aggregatum types L.
Puerro o Ajo puerro, bulbo y hojas de	<i>Allium porrum</i> L.
TALLOS Y PECIOLOS	
Cardo, peciolo de	<i>Cynara cardunculus</i> L.
Esparago, (stem) bulbo del rizoma de	<i>Asparagus officinalis</i> L.
Hinojo, peciolo de	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
Quirón, peciolo de	<i>Gumera apiculata</i> Schrad.
Rubabo, peciolo de	<i>Rheum rhabdanthum</i> L.
Salicornia	<i>Salicornia (Amarocoma) nees Salicornia (Amarocoma) magellanica</i>
HORTALIZAS DE HOJAS(EXCEPTO LAS DEL GÉNERO BRASSICA)	
Acelera	<i>Rumex acetosa</i> L.
Ajuga	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>crista</i> (L.) W.D. J. Koch.
Achicoria, Radichetta, Radichio, radichio rosso y	<i>Cichorium intybus</i> L.
radichio negro	<i>Ocimum basilicum</i> L.
Albahaca	<i>Medicago sativa</i> L.
Albato, brotes de	<i>Amaranthus caudatus</i> L. <i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>cruentus</i> (L.) Thell. <i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i> . <i>Amaranthus mangazzianus</i> Pass.
Amaranto	<i>Amaranthus mangazzianus</i> Pass.
Ajo de puerro, puerro, hojas completas (peciolos y	<i>Apium graveolens</i> L.
láminas) de	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek
Berro de agua	<i>Lepidium sativum</i> L.
Berro de tierra o de huerta	<i>Valerianella oleracea</i> (L.) Polak
Cardo	<i>Conardium sativum</i> L.
Chirón	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.
Diente de león, amargón o taraxacon	<i>Cichorium endivia</i> L.
Endivia	<i>Cichorium endivia</i> L.
Escarola	<i>Spinacea oleracea</i> L.
Esparago	<i>Lactuca sativa</i> L.
Lettuga	<i>Lactuca didymum</i> L.
Mastuerzo o Químpe	<i>Pastinaca sativa</i> (Mill.) Pers.
Pequeño	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell.
Ricota, rigola, rocket o rocketa	
INFLORESCENCIAS, FLORES O PIMOLLOS	
Abraxa	<i>Capparis spinosa</i> L.
Alcañal o alcachofa	<i>Cynara scolymus</i> L.
Ligüto	<i>Humulus lupulus</i> L.
HORTALIZAS DE FRUTO	
Aj picante, chile	<i>Capiscum frutescens</i> L.
Aj Macho, ají catracho, ají, quichito o frutes de	<i>Capiscum baccatum</i> var.
Berenjena	<i>Solanum melongena</i> L.
Chucha	<i>Physalis peruviana</i> L.
Chucho o maíz dulce	<i>Zea mays</i> L.
Gombo, kimbombó, berne, chauchalutaca o kiavo	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.
Papa de ana, chicho, kuro o chayote	<i>Sesuvium edule</i> (Jacq.) Ste.
Papa de agua, chayote, papa de monte,	<i>Vasconcellea pubescens</i> A. DC. // <i>Carica pubescens</i>
payayula, chamburo o chifluacán	<i>Lemon & K. Koch</i>
Pepino	<i>Cucumis sativus</i> L.
Pimiento	<i>Capiscum annuum</i> L.
Licuto	<i>Capiscum pubescens</i> Ruiz & Pav.
Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. // <i>Solanum lycopersicum</i> L.
Tomate cherry	<i>Solanum lycopersicum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) Spooner.
Zapallo redondo de tronco	<i>Andersen & Jensen</i>
Zapallo o calabaza	<i>Cucurbita maxima</i> var. <i>zapallo</i> Millán
	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne en Lam. <i>Cucurbita pepo</i> L.
	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne. <i>Cucurbita melo</i> Parlati
	(syn <i>Cucurbita argyropurpurea</i> K. Koch). <i>Cucurbita maxima</i>
	v.c. <i>moschata</i> . <i>Cucurbita decurvenata</i> (Smul)
	L.H. Bailey 1950 y otras especies de <i>Cucurbita</i>
	comestibles (?)
	C. pepo L. var. <i>cylindrica</i> Pers.
Zucchini	
COLES(HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA)	
Inflorescencias	
Brécol	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Pteroc.
De cabeza o frondoso	<i>Brassica oleracea</i> subvar. <i>capitata</i> Duchesne
Cofito	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> L.
Nabiza y gnelo	<i>Brassica napus</i> L.
Hojas	
Coles chinas(Akaiya/Pak choi o acaja china)	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>glabra</i> Regel <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hance // <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hance
Coles de invierno o berzas	<i>Brassica oleracea</i> L. subvar. <i>pinnatifida</i> DC. <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> DC.
Coles de Milán	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.
Kale o col de invierno	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>sabauda</i> L.
Rapollito de Bruselas	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> (DC.) Zentgraf
Rapollito blanco	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.
Rapollito colorado	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> DC.
Tallo camote	
Col-dibano	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongyloides</i> L.
Raíz camotea	
Colrabo o Rutabaga	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Jaffr. // <i>Brassica napus</i> subsp. <i>napifera</i> Metzger
Nabo	<i>Brassica napus</i> L. <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L.





ARTÍCULO 2º. - Sustitúyese el Artículo 888 del Código Alimentario Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 888: Las frutas frescas comestibles son las siguientes:

CITRICOS	Nombre común	Nombre taxonómico
Naranja común	Naranja dulce	Citrus sinensis (L.) Osbeck
Naranja amarga	Limon	Citrus aurantium L.
Limon	Mandarina	Citrus limon (L.) Burm. f.
Pomelo	Cidra	Citrus reticulata Blanco y Citrus deliciosa Ten.
Kumquat, Quinoto	Lima, Lima dulce, Lima dulce de Túniz, Limonero dulce del Mediterráneo	Citrus medica L.
Lima, Lima dulce, Lima dulce de Túniz, Limonero dulce del Mediterráneo	Lima limón, lima ácida, lima key, limón sutil	Fortunella margarita (Loar.) Swingle y Fortunella japonica (Thunb.) Swingle
Lima Tahiti, Lima de Persia	Lima dulce de Palestina o Lima dulce	Citrus limetta Risso
Tangelo	Tanger	Citrus x aurantifolia (Christm.) Swingle // Citrus aurantifolia Swingle
Calamondin	PEPITA	Citrus x latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka
Nombre común	Nombre taxonómico	Citrus x tangelo (J. W. Ingram & H. E. Moore) // Citrus reticulata x Citrus paradisi
Manzana	Pera	Citrus x nobilis Loar // Citrus reticulata x Citrus sinensis
Pera	Pera asiática	Citrofortunella microcarpa (Bunge) Wijnands // Citrus madurensis Loureiro
Mentelillo	Nispero europeo	Nombre taxonómico
Nispero japonés	CAJICHO	Malus domestica Borkh. y otras especies de Malus comestibles(*)
Nombre común	Nombre taxonómico	Pyrus communis L.
Cereza	Chai Chai o Coco	Pyrus pyrifolia (Burm.) Nakai
Chai Chai o Coco	Chafar	Cydonia oblonga Mill.
Chafar	Cruela europea	Mespilus germanica L.
Cruela japonesa	Copozú o Cupuazú	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Copozú o Cupuazú	Damasco	Nombre taxonómico
Damasco	Durazno	Prunus avium (L.) L.
Guinda	Guinda	Albizia juliflora (R. & H.) Radlk.
Nectarina o pelón	Pindí, Coquito o Jervá	Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.)
Pindí, Coquito o Jervá	Ubajay	Prunus domestica L.
Ubajay	BAYAS Y OTRAS FRUTAS PEQUEÑAS	Prunus salicina Lindl.
Nombre común	Nombre taxonómico	Theobroma grandiflorum (*)
Afándano	Catalpa/Catalpe o Michay	Prunus americana L.
Catalpa/Catalpe o Michay	Capulí, uchufa o aguayuntato	Prunus persica (L.) Batsch.
Capulí, uchufa o aguayuntato	Caraguatá	Prunus cerasus L.
Caraguatá	Cereza o Cereza de Monte	Prunus persica (L.) Batsch. var nectarina (Aiton) Maxim // Prunus pérsica (L.) Batsch var. Nectarina (Bouché) C. K. Schmidt.
Cereza o Cereza de Monte	Frambuesa	Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman.
Frambuesa	Frutilla silvestre	Eugenia myrcianthes Niesl.
Frutilla silvestre	Frutilla	Nombre taxonómico
Frutilla	Grosella blanca o uva espina	Vaccinium corymbosum L. y otras especies de Vaccinium L. comestibles(*)
Grosella blanca o uva espina	Grosella negra o cassis	Berberis myrsiphylla O. Forst.Berberis darwini Hook.
Grosella roja o comito	Guaybil o Guabillo	Physalis peruviana L.
Guaybil o Guabillo	Guayvobalguabiraba o guavirá	Bromelia balansae Mez
Guayvobalguabiraba o guavirá	Jaborcaba, Yaborcaba o Jabuticaba	Eugenia involucrata DC
Jaborcaba, Yaborcaba o Jabuticaba	Jacararí o Jacararí	Rubus idaeus L.
Jacararí o Jacararí	Mbacayá, Cocotero, Nuez, Coco del Paraguay	Fragaria vesca (L.) Coville
Mbacayá, Cocotero, Nuez, Coco del Paraguay	Mora (arbores)	Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier
Mora (arbores)	Maqui	Ribes rubrum L.
Maqui	Manzana de Java, Manzana de cera, Manzana rosa	Ribes nigrum L.
Manzana de Java, Manzana de cera, Manzana rosa	Mistol	Ribes rubrum L.
Mistol	Mora o Zaramora, (arbores)	Mycanthes pungens (O. Berg) O. Legrand
Mora o Zaramora, (arbores)	Rosa incognita	Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O. Berg
Rosa incognita	Piquilín	Pinus cauliflora (Mart.) Hausskn(Pinus peruviana)(Poir.)
Piquilín	Pitanga, fangapi o arrayán	Jacararí spinosa (Aubl.) A. DC
Pitanga, fangapi o arrayán	Pitaya, Pitahaya o Fruta del dragón	Accosmia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Pitaya, Pitahaya o Fruta del dragón	Salico	Morus alba L. y M. nigra L.
Salico	Siete capotes	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz.
Siete capotes	Uva	Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M. Perry
Uva	Uvilla grande, Uvilla de gente, Palo amarillo o Micuna	Ziziphus mistol Gris.
Uvilla grande, Uvilla de gente, Palo amarillo o Micuna	Yaportí	Rubus ulmifolius Schott. y otras especies de Rubus comestibles (*)
Yaportí	Zarzaparrilla o Parrilla	Rosa rubiginosa L. - Rosa canina L.
Zarzaparrilla o Parrilla	CUCURBITAS	Cordia microphylla Cav.
CUCURBITAS	Nombre común	Eugenia uniflora L.
Nombre común	Nombre taxonómico	Hylconemus undatus (Paw.) Britton & Rose // Stenocarpus thurberi (Engelmann) Buxbaum
Achicofa o Cagpa	GAC	Sambucus australis Cham. Schlét. y Sambucus nigra L.
GAC	Melón	Campomanesia guianensis (Cambess.) O. Berg
Melón	Sandia	Vitis vinifera L. y otras especies de Vitis comestibles (*)
Sandia	Pepero dulce	Eugenia pyriformis Cambess. var Pyriformis. sin. Eugenia uvaiha Cambes.
Pepero dulce	Cayota o alcayota	Berberis commutata (Eichler).
Cayota o alcayota	Zapallo redondo de tronco	Pinia rivularis Cambess. Roemer
Zapallo redondo de tronco	OTRAS	Ribes magellanicum Poir.
OTRAS	Nombre común	Nombre taxonómico
Nombre común	Nombre taxonómico	Cyclanthera petiolata(L.) Shauer
Aji o acaí	Acacia	Momordica cochinchinensis **
Acacia	Ananá o Piña	Cucumis melo L.
Ananá o Piña	Araticó, Yerba Mora o Chirimoya del monte	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai.
Araticó, Yerba Mora o Chirimoya del monte	Babaco	Solanum muricatum Aiton.
Babaco	Badea	Cucurbita ficifolia Bouché.
Badea	Banana	Cucurbita maxima var zapallo Millán
Banana	Carambola	Nombre taxonómico
Carambola	Chirimoya	Euphorbia tirucalli Mart.
Chirimoya	Coco	Mangifera mangifera DC.
Coco	Dátil	Annona comosus (L.) Merr.
Dátil	Durian o Durón	Annona emarginata (Schltd.) H. Rainer
Durian o Durón	Falso Guayabo, Feijoa o Guayabo del país	Carica pentagona Heilborn //
Falso Guayabo, Feijoa o Guayabo del país	Granada	Vaccinella x heilborni (V. M. Baudin) V. M. Baudin
Granada	Granadilla	Passiflora quadrangularis L.
Granadilla	Guambana	Musa x paradisiaca L. y otras especies de Musa comestibles (*)
Guambana	Guaba o pacay	Averrhoa carambola L.
Guaba o pacay	Guayaba	Annona cherimola Mill.
Guayaba	Higo o breva	Coccoloba indica L.
Higo o breva	Higuera del monte, Papaya del monte, Mamón del monte, Papaya silvestre.	Coccoloba indica L.
Higuera del monte, Papaya del monte, Mamón del monte, Papaya silvestre.	Sacha higo o Sacha higuera	Phoenix dactylifera L.
Sacha higo o Sacha higuera	Kaki o caga	Durio zibethinus L.
Kaki o caga	Kiwi	Actinidia chinensis Sims.
Kiwi	Lichi	Euphorbia longiana Steud //
Lichi	Longan	Dimocarpus longan Loar.
Longan	Lúcuma	Platanus lucuma (Ruiz & Pav.) Kunze
Lúcuma	Mamón o Papaya	Carica papaya L.
Mamón o Papaya	Mango	Mangifera indica L.
Mango	Mangostán o Mangosteen	Garcinia mangostana L.
Mangostán o Mangosteen	Olivo o Acahuate	Oliva europaea L.
Olivo o Acahuate	Palmito (její'a)	Euterpe edulis Mart.
Palmito (její'a)	Palta	Persia americana Mill. y otras especies y variedades de Persia comestibles
Palta	Pasionaria, maracují amarillo o mburucujá	Passiflora edulis Sims.
Pasionaria, maracují amarillo o mburucujá	Rambutan	Nephelium lappaceum L.
Rambutan	Salacca	Salacca ziziphi L.
Salacca	Tasi o Doce	Artocarpus odorata (Hook. & Arn.) Fontella & Goyler.
Tasi o Doce	Tomate de árbol	Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn.
Tomate de árbol	Tuna	Opuntia ficus-indica (L.) Mill. y otras especies de Opuntia comestibles (*)
Tuna	Yatay	Butia yatay





(*) Comestibles que hayan sido evaluadas por la autoridad sanitaria competente.

(**) Se permite su uso para la industrialización, no para consumo directo.

ARTÍCULO 3°. - La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alejandro Alberto Vilches - Sergio Iraeta

e. 04/07/2025 N° 46664/25 v. 04/07/2025

Fecha de publicación 04/07/2025

